

DC-konvertering

Med denne patientinformation vil vi byde dig velkommen til Privathospitalet Mølholm, Hjerteklinikken og informere dig om forholdene i forbindelse med DC-konvertering.

Formålet med DC-konvertering

Hvis du har en hurtig eller uregelmæssig hjerterytme (forkammerflimmer) kan du tilbydes en DC-konvertering. Ved DC-konvertering støder man hjertet, så det opnår en normal regelmæssig hjerterytme, kaldet sinusrytme.

Medicin forud for behandlingen

Hvis ikke du har været i blodfortyndende medicinsk behandling (Marevan, Xarelto, Eliquis, Pradaxa eller Lixiana) 3-4 uger inden DC-konvertering, vil vi altid foretage en speciel ultralydsundersøgelse fra spiserøret - TEE - som foretages i fuld bedøvelse. Dette gøres for at udelukke blodpropsdannelser i venstre forkammer. Dette der dog ikke nødvendigt, hvis din forkammerflimmer har været kortere end 48 timer.

Vi vil også foretage denne ultralydsundersøgelse, hvis du får Marevan og din blodfortyndingsgrad (INR) ikke sikkert har været i niveau mellem 2 og 3 i de sidste 3-4 uger.

Behandlingsdagen

Du skal være fastende for fast føde i minimum 6 timer før mødetidspunktet. Du må dig gerne drikke indtil 2 timer før (dog ikke mælkeholdige produkter).

Du skal tage din morgenmedicin.

DC-konverteringen foregår på en sengestue, hvor der er narkoselæge og sygeplejerske tilstede.

Du får lagt en kanyle i en blodåre i hånden. Der tages EKG og måles blodtryk, puls og evt INR.

Behandlingen foregår ved, at der påsættes 2 geléagtige plader på din brystkasse samt elektroder, hvorfra vi kan følge din hjerterytme under behandlingen.

Du får en kortvarig bedøvelse (ca. 5-10 min), mens DC-konverteringen foretages.

Du er hurtig vågen igen og vil få tilbudt mad og drikke.

Du må udskrives efter 1-2 timer, når du er velbefindende.

Inden udskrivelse aftales det videre forløb, herunder eventuelle medicinændringer.

Hvis det ikke lykkedes, at DC-konvertere dig over i normal hjerterytme, tages der ligeledes stilling til det videre forløb.

På grund af bedøvelsen må du ikke køre bil eller være alene det første døgn.