

Fjernelse af spytkirtel i mundbunden

Ved gener eller vedvarende hævelse af en spytkirtel i mundbunden kan denne fjernes. Kirtlen fjernes fra ydersiden af halsen. Du vil derfor få et mindre ar opadtil på halsen.

Før operationen

Hvis du er forhindret i at møde på det aftalte tidspunkt, beder vi dig give os besked på tlf.: [8720 3040](tel:87203040).

Kontakt også Mølholm, hvis du bliver syg i tiden op til operationsdagen. I tilfælde af akutte infektionssygdomme eller feber og forkølelse vil operationen blive udsat.

Efter operationen

Bør du være sygemeldt i ca. en uge.

Dine forberedelser til operationen

Du skal følge fastereglerne i indkaldelsen til operationen.

Inden du møder til operationen, skal du tage bad, børste tænder, vaske hår og ansigt. Du må ikke have makeup og neglelak på, da vi skal kunne se din naturlige kulør.

Husk etui til eventuelle kontaktlinser. Inden operationen afleveres de til opbevaring hos sygeplejersken. Bruger du briller eller tandprotese, må du gerne beholde dem på, til du kommer på operationsstuen, hvor en sygeplejerske evt. vil opbevare dem under operationen.

Operationsdagens forløb

Du vil få anvist en seng, og narkoselægen kommer og taler med dig. Efter operationen vil du blive overvåget af en sygeplejerske.

Operationen

Operationen foregår i fuld bedøvelse. Hele spytkirtlen fjernes. Der vil som hovedregel blive placeret et dræn i såret for at undgå hævelse det første døgn.

Efter operationen

Drænet fjernes dagen efter operationen, og samme dag bliver du udskrevet.

Der kan være let hævelse omkring operationssåret den første uge. Der vil komme let nedsat følelse i huden omkring operationsåret. Nogle vil opleve lettere mundtørhed.

Meget sjældent opstår der varig skade på nerven til mundvigen og tungen. Der vil altid være en lille risiko for blødning og infektion i dagene efter operationen.

Hvis du får feber eller kraftig hævelse og rødme af operationssåret, skal du kontakte Mølholm.

Vi anbefaler, at du i 2 uger efter operationen undgår fysisk aktivitet for at undgå belastning af det sammensyede sår.

Hjemtransport

Du skal hentes af et familiemedlem eller en bekendt, som kan følge dig hjem i bil eller taxa. Hvis du har mulighed for at blive kørt hjem af Falck, behøver du ingen anden ledsagelse på hjemturen. I hjemmet skal der være en voksen person, der kan holde øje med dig det første døgn efter operationen. Du bør holde dig

inden døre i dette døgn.

Kontrol efter operationen

Inden du går hjem, vil du blive medgivet en tid til kontrol på Mølholm ca. 2 uger efter operationen.

Skulle du være i tvivl om noget efter udskrivelsen, eller får du feber, betydelige smerter eller andre problemer, er du velkommen til at ringe til Mølholm på telefon [8720 3040](tel:87203040).