

Canthacur behandling af vorter

Hvad er Canthacur?

Canthacur er et ekstrakt udvundet af en blisterbille.

Hvordan virker Canthacur behandlingen

Efter beskæring pensles med Canthacur, hvorved der skabes vabel og sårdannelse over vorten. Det medfører dels at vorten reduceres, og at dit eget immunforsvar stimuleres til at nedbryde vortevirusset.

Selve behandlingen

Efter beskæring pensles med Canthacur, og der dækkes med plaster. Efter den aftalte tid skal du tage plastret af og efterfølgende vaske det behandlede område med vand og sæbe.

Forholdsregler

Der vil være rødme, svie og vabeldannelse i området i tiden efter behandlingen. Hvis vablen er meget til gene, kan vablen punkteres med en steril nål. Når vablen er bristet, vil der være et sår, der holdes rent med god daglig hygiejne med vand og sæbe. Dæk eventuelt sår efter vabeldannelsen med plaster, hvis det væsker.

Da der er sårdannelse, vil der være en lille, potentiel risiko for infektion. Hvis der er tegn på infektion, dvs. rødme, varme, hævelse og ømhed i det behandlede område, kontaktes egen praktiserende læge.

Gravide og ammende kan ikke behandles med Canthacur.

Efterforløbet

Cirka en uge efter opheling kan vorten/vorterne skrubes med skalpel (kan købes på apoteket), så den fortykkede hud skrubes af, inden der påføres Vortex Plus (købes på apoteket i håndkøb). Vortex Plus anvendes dagligt, til vorten er væk. Hav tålmodighed, da vortebehandling ofte er en langvarig og tidskrævende proces.