

Regler for din vanlige medicin før operationen

I forbindelse med operationen skal du tage din medicin som vanligt.

Der er dog følgende undtagelser:

Acetylsalicylsyre (f.eks. Hjerdyl®, Hjertemagnyl®, Kodimagyl®, Treo®)

Stoppes 3 dage før operationen og genoptages dagen efter operationen.

OBS: Hvis du tidligere har haft blodprop, gennemgået ballonudvidelse eller fået indlagt stent i hjertet, gælder særlige regler, og du må kun stoppe med Acetylsalicylsyre, når det er aftalt med lægen.

Andre typer af blodfortyndende medicin

Du skal aftale med lægen om der skal holdes pause med blodfortyndende medicin op til operationen.

NSAID (smertestillende "gigtmedicin")*

Stoppes 5 dage før operationen – dog 14 dage for tenoxicam (Tilcotil®).

Eksempler på smertestillende "gigtmedicin" der skal stoppes 5 dage før operationen: Arcoxia, Bonyl, Brufen, Burrana, Celebra, Celebrex, Confortid, Diclodan, Diclofenac, Diclon, Dynastat, Eox, Ibumax, Ibumetin, Ibuprofen, Ibustar, Ipren, Ketesse, Meloxicam, Migea, Modifenac, Naproxyn, Nurofen, Relifex, Seractiv, Surgamyl, Tilcitin, Todalac, Vimovo, Voltaren, Xefo, Arthotec.

Sukkersygemedicin

- Ved planlagt operation før kl. 12 skal du ikke tage insulin og anden blodsukkerregulerende medicin om morgenen på operationsdagen.
- Ved planlagt operation efter kl. 12 skal du tage insulin og anden blodsukkerregulerende medicin som vanligt om morgenen på operationsdagen.

Naturmedicin, kosttilskud herunder fiskeolier

Stoppes 7 dage før operationen og genoptages dagen efter operationen.

Naltrexon

Stoppes 3 dage før operationen og genoptages 3 dage efter ophør med morfinlignende medicin efter operationen.