

RFA vid förmaksfladder (SE)

Radiofrekvensablation (förmaksfladder)

Ablation (värmebehandling) av förmaksfladder (radiofrekvensablation)

Med denna patientinformation hälsar vi dig välkommen till Hjerteklinikken på Privathospitalet Mølholm och informerar dig om återbehandlingen.

Personalen kommer att göra sitt yttersta för att du ska känna dig trygg och välbehandlad under din vistelse. Vårt mål är att kombinera professionellt bemötande med god mänsklig kontakt.

Radiofrekvensablation (RFA)

Syftet med behandlingen är först och främst att ta bort de onormala impulsbildningarna.

Erfarenheten med radiofrekvent ablation av förmaksfladder är att 90 % eller fler av patienterna blir hjälpta av behandlingen.

Generell information

Förberedelser hemifrån (fasta regler)


Du måste fasta från fast föda i minst 6 timmar före mötestiden. Däremot är du välkommen att dricka upp till 2 timmar före mötestiden (inga mejeriprodukter). Du får inte röka 2 timmar före mötestiden.

Medicin

Du måste fortsätta oförändrad med din vanliga medicin fram till inläggningen. Detta gäller även om du tar Marevan eller Pradaxa/Eliquis/Xarelto/Lixiana som blodförtunnande medel.

Rakning

Vi vill be dig att ta bort ev hår på bröstet och i höger ljumske med engångsskrapa dagen innan inläggning. Du måste raka bröstet och ljumsken motsvarande det skuggade området.



Ta med

Toalettartiklar, tofflor och bekväma kläder. Ta också med din vanliga medicin.

Ledsagare och transport

Du får gärna ta med en ledsagare, men det är inte nödvändigt. Du får gärna bära helgväska/resväska med ombyte och toalettartiklar själv och gärna köra egen bil eller åka kollektivt (inklusive flyg) dagen efter behandlingen.

Besökstid

Under sjukhusvistelsen kan dina anhöriga ringa sekretariatet på [+45 76 42 74 20](tel:+4576427420).

Mobiltelefoner är tillåtna.

Inläggningsdagen

Förberedelse inför behandlingen

På inläggningsdagen tas du emot av en sjuksköterska som hjälper dig att bosätta dig och ger dig information om vistelsen. Du kommer att informeras om slutlig behandlingstid och de särskilda försiktighetsåtgärder som kommer att vidtas i samband med behandlingen.

Du kommer att ha en plastnål insatt i en ven i armen. Blodtryck och puls mäts och blodprover och EKG tas.

Den behandlande läkaren kommer att prata med dig omedelbart före operationen och informera dig om detaljer, inklusive om det finns några speciella tillstånd i din rytmrubbning som kan påverka effekten och biverkningarna av behandlingen. Det kommer att finnas gott om tid för detta samtal och dina anhöriga är självklart välkomna att delta.

Själva behandlingen

Behandlingen varar ca. 2 timmar. Mycket teknisk utrustning som röntgenutrustning används i behandlingsrummet.

Du kan læsa mer om anvendningen av röntgen här: Röntgen

Tunna katetrar förs in i hjärtat från venerna i ljumsken. Från katetrarna kan de elektriska strömmarna i hjärtat mätas. Olika ställen i hjärtat mäts och när läkaren hittat orsaken till rytmstörningen läggs kateterspetsen mot insidan av hjärtväggen. Med en lätt uppvärmning av kateterspetsen till ca. 65 grader avlägsnas orsaken till rytmstörningen. Interventionen utförs i en kombination av lokalbedövning och kraftig berusning av anestetika.

Efter behandlingen

Du kommer att observeras av en sjuksköterska under de kommande 2 timmarna, då du måste ligga platt i sängen på grund av risken för blödning från såret i ljumsken.

Om du känner obehag, smärta, värme eller svullnad i ljumsken måste du göra sjuksköterskan uppmärksam på detta.

Före utskrivning kommer specialisten att prata med dig. Det kommer att finnas möjlighet att diskutera ev försiktighetsåtgärder i framtiden.

Utskrivning

Din förväntade utskrivningstid framgår av kallelsesbrevet.

Före utskrivning kontrolleras injektionsstället och du kommer att ha ett samtal med behandlande läkare. Det kommer att finnas möjlighet att diskutera ev försiktighetsåtgärder i framtiden

Du får utskrivningspapper, vi skickar även ett utskrivningsbrev och en beskrivning av behandlingen till din egen läkare och till det sjukhus som remitterat dig för behandling.

Du får gärna köra själv eller åka kollektivt (inklusive flyg) dagen efter behandlingen.

Komplikationer

I sällsynta fall (totalt mindre än 1 % risk) kan komplikationer uppstå:

- större bloduppsamling vid injektionsstället i ljumsken
- ansamling av blod i hjärtsäcken
- luft i lungsäcken
- bildning av små blodproppar i kärlen, i hjärtat eller i andra organ (hjärna, njurar, lungor)

Dessa komplikationer kan kräva observation eller särskild behandling, som kan utföras på plats. Du kommer att informeras om din risk under intervjun med specialisten innan behandlingen.

Hemma igen

Första veckan måste du skydda ljumsken genom att t.ex. för att undvika tunga lyft och långa promenader. Vi rekommenderar att du väntar totalt två veckor innan du spelar sport.

Du kan återuppta ditt vanliga arbete ca. 1 vecka efter utskrivning. Om du har särskilt hårt fysiskt arbete måste du vänta 2 veckor innan du återupptar detta.

Många patienter har huvudvärk och smärta/tryck/sorl i bröstet de första dagarna efter behandlingen. Om så är fallet kan Panodil minska besvären.

Med denna patientinformation hoppas vi att vi kunnat besvara några av de frågor, som du eller dina anhöriga har kring behandling med radiofrekvensablation på Hjerteklinikken Mølholm. Informationen ersätter inte muntlig information och du är alltid välkommen att ställa frågor.

Privathospitalet Mølholm är Danmarks äldsta privatsjukhus och kännetecknas av hög kvalitet och maximal fokus på dig som patient. Du är vår gäst.

Hjerteklinikken Mølholm på Privathospitalet Mølholm kan alltid kontaktas:

Tlf.: [+45 76 42 74 20](tel:+4576427420)

Mail: hjerte@molholm.dk

Du kan söka ytterligare information på klinikchef Peter Steen Hansens blog: www.rytmedoktor.dk